

CONDYLOMES ACUMINES ó MESSAGES CLES

Face à des condylomes acuminés de la région anale chez l'homme :

- Une exploration génitale chez le sujet concerné est utile en raison d'une transmissibilité accrue.
- Chez la conjointe, l'exploration génitale est nécessaire et l'examen de l'anus également en cas de rapports anaux.
- La présence de condylomes acuminés génito-anaux expose le partenaire à un risque d'anomalies identiques d'environ 50 %.
- Le délai d'apparition, après l'exposition, est court de 3 à 8 mois.

De fait, la première exploration chez la partenaire ne doit pas être envisagée avant 8 mois après le premier contact.

- Le risque de récurrence, après traitement, varie de 30 à 50 % selon l'étendue des lésions et le statut immunitaire.
- Les condylomes acuminés sont induits par des papillomavirus à bas risque (6-11 dans plus de 80 % des cas).

Cependant, le risque de co-infection avec des HPV à haut risque est toujours possible.

L'histoire naturelle des HPV à haut risque étant toujours plus longue (entre 2 et 5 ans selon l'âge, le type de virus et les sites concernés), le suivi au niveau génital chez la partenaire féminine doit être maintenu.

- Pour cette raison, les condylomes acuminés sont considérés comme un facteur de risque de néoplasie intra épithéliale du fait des co-infections possibles avec les HPV à haut risque.