

Transmission génitale des HPV



I. Condylomes Acuminés (induits par les HPV à bas risque)

Transmission orale

- . Histoire naturelle courte : 4-6 mois.
- . Récidives après traitement : 10 à 60% selon le sexe, l'étendue et la localisation.
- . Pathologie très fréquente : 1%.
- . Aussi fréquents dans les 2 sexes : 15-25 ans.
- . Hautement transmissible : dans 65% des cas le couple est concerné.
- . Le préservatif est nécessaire et doit être maintenu au moins 8 mois après rémission.
- . L'examen du partenaire est impératif.

II. Transmission des HPV à risque

Transmission homme - femme

1. La transmissibilité virale est de 40 à 60%/acte.
2. La période de clearance des HPV chez l'homme est courte (7 mois en moyenne, ~ 12 mois pour HPV16).
3. La clearance des HPV chez l'homme est de 90% environ.
4. Dans un couple stable, au moment où l'on observe des lésions chez la femme (HPV HR), compte tenu d'une évolution longue à développer des lésions à HPV (12 à 40 mois en moyenne), l'homme a en général éliminé son virus et n'est plus concerné par l'infection au moment où la partenaire présente des lésions.
5. Précautions:
 - Avec un nouveau partenaire ou en cas de changement de partenaire, les rapports protégés sur une période de 8 à 12 mois seraient susceptibles de protéger la femme d'une éventuelle exposition au HPV.
 - Avec un ancien partenaire stable, il n'est pas utile d'adopter des mesures de précaution particulières ou de proposer un examen systématique des hommes, à l'exception de ceux qui observent des lésions sur le pénis ou qui appartiennent à une population à risque.

Transmission orale

- . Prévalence du HPV : 5 à 10 fois moindre / transmission génitale.
- . Le nombre de partenaires avec sexualité orale augmente le risque d'exposition.
- . Les hommes sont 3 fois plus exposés que les femmes, le risque augmente avec l'âge.
- . Le HPV16 est le plus fréquent.
- . La clearance virale est élevée.
- . A ce jour, il est prématuré de proposer des recommandations.

Les idées fausses sur l'infection à HPV

- . L'infection à HPV est **une IST comme les autres** : FAUX
- . L'infection à HPV est **une infection chronique** : FAUX
- . Le **préservatif pour tous** doit être préconisé en cas d'infection à HPV : FAUX
- . Il faut un **examen systématique des hommes** : FAUX

- . Il n'y **pas de risque sans rapports intimes** : FAUX
 - . **Les homosexuels sont préservés** de l'infection à HPV : FAUX
 - . On peut **confondre HPV et lésions associées** : FAUX
-